



La recherche sur la maltraitance envers les aînés au Québec :

résumés d'articles scientifiques



Validation de la liste des indices de situations abusives (LISA).

Référence

Reis, M. & Nahmias, D. (1998). Validation de la Liste des indices de situations abusives (LISA) (Version originale étudiée : Indicators of Abuse [IOA]). *The Gerontologist*, 38(4), 471-480.

Type de texte

Format : Article scientifique
Contenu : Validation d'outil

Thèmes abordés

Définition, ampleur du phénomène, formes de maltraitance à domicile, facteurs de risque, facteurs de vulnérabilité, profil de la personne maltraitée, auteurs de la maltraitance, dépistage, intervention, fardeau et stress, formation.

But ou question de recherche

Le but principal de cette étude est de développer et de valider l'IOA (*The Indicators of Abuse Screen*).

Problématique

On estime que la maltraitance touche de 3 à 5% de la population des aînés. Or, la maltraitance ou la négligence à l'égard des personnes âgées n'est pas toujours facile à dépister et rares sont les mesures de dépistages validées qui peuvent aider les intervenants à identifier cette problématique. Le « Brief Abuse Screen for the Elderly » apparaît comme un outil intéressant et valide pour identifier les situations de maltraitance. Cependant, l'évaluation est basée sur un seul facteur et les intervenants doivent être préalablement formés pour l'identification de telles situations.

Méthodologie

La présente étude s'effectue sur 341 cas de personnes âgées qui ont fait l'objet de visites à domicile par des intervenants professionnels d'une agence de santé et de services sociaux pendant une période d'environ 18 mois. Elles doivent être âgées de 55 ans ou plus et leur prestataire de soin ne doit pas être payé. Une liste préétablie comprenant 48 articles et le « Brief Abuse Screen for the Elderly » ont été complétés suite à une entrevue téléphonique et une visite à domicile d'une durée de 2 ou 3 heures. La principale approche d'analyse des données a été l'analyse factorielle discriminante.

Résultats

Un total de 29 indicateurs (IOA) ont permis de séparer les situations de maltraitance probables et non probables dans 96.3 % des cas. De plus, ces indicateurs permettent de discriminer plus de 78.4% des cas de maltraitance confirmés et 100% des cas qui ne présentent pas de maltraitance. Les variables les moins importantes se sont révélées comme étant l'aide aux activités de la vie quotidienne, un handicap physique ou mental, les difficultés économiques autres que la dépendance financière, le désir de l'institutionnalisation et le fait de se sentir stressé. Une zone à risque a été déterminée lorsqu'une personne obtient un score de 16.0 ou plus dans l'IOA. Les indicateurs de maltraitance qui ressortent sont les conflits familiaux et conjugaux, la santé mentale et les problèmes de comportements du prestataire de soin ainsi que la maltraitance passée de la personne âgée.

Discussion

Les résultats démontrent la validité divergente, concurrente et de construit des 29 items de l'IOA. La fiabilité est également prouvée grâce à la grande consistance interne de l'ensemble des items, excluant les aspects démographiques, la relation entre l'aidant et la personne âgée ainsi que l'âge de cette dernière. Les variables non discriminantes peuvent constituer des problématiques importantes et nécessiter une intervention, mais elles ne permettent pas de détecter les situations de maltraitance. Les indicateurs de maltraitance peuvent être organisés en trois catégories soit les problèmes intrapersonnels de l'aidant, les problèmes interpersonnels de cet aidant ainsi que le faible support social et le passé de maltraitance de la personne âgée qui reçoit les soins. Il apparaît que les caractéristiques de l'aidant seraient davantage reliées aux situations de maltraitance que celles de la personne âgée.

Conclusion

Cette étude a permis de valider l'IOA comme outil de dépistage approprié pour les intervenants qui désirent identifier les cas de maltraitance parmi leur clientèle. Il s'agit d'un outil rapide, simple et peu coûteux qui peut être employé en parallèle avec d'autres outils de dépistage. Cet outil peut être utile pour indiquer le potentiel de retour de la maltraitance ou le risque de maltraitance future. Il peut également servir à des fins d'enseignement et permettre de guider l'intervention des professionnels.

Pistes pour la pratique ou la recherche

Les auteures suggèrent d'explorer la pertinence d'utiliser l'IOA comme outil d'enseignement et de planification de l'intervention. Elles mentionnent également la possibilité de mener d'autres études et d'ajouter des indicateurs à l'IOA afin d'en augmenter la précision. Enfin, elles insistent sur le fait que le seuil de 16.0 délimitant la zone à risque est seulement indicatif et que les cas présentant un résultat inférieur devraient être examinés davantage et être objets de recherches futures.

Date de réalisation de la fiche :

23 septembre 2013

